




REGISTRO TUMORI REGIONE CAMPANIA - INCIDENZA ONCOLOGICA MASCHI.

ANNI 2010 - 2017 - TASSI STANDARDIZZATI EUROPA 2013

| SEDE | CAMPANIA | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | TSD* | I.C. 95%** | |
| | | INF. | SUP. |
| Esofago | 3,4 | 3,2 | 3,7 |
| Testa Collo ¹ | 12,8 | 11,4 | 14,4 |
| Stomaco | 26,4 | 25,6 | 27,2 |
| Colon, retto e ano | 87,8 | 85,9 | 89,8 |
| Fegato | 36,6 | 35,7 | 37,5 |
| Colecisti e vie biliari | 7,5 | 7,1 | 8,0 |
| Pancreas | 16,5 | 15,9 | 17,1 |
| Laringe | 15,6 | 15,1 | 16,2 |
| Polmone | 121,3 | 119,7 | 123,0 |
| Osso | 1,3 | 1,1 | 1,4 |
| Melanomi: cute | 17,0 | 16,4 | 17,6 |
| Mesotelioma | 3,4 | 3,1 | 3,7 |
| S. di Kaposi | 2,5 | 2,2 | 2,7 |
| Tessuti molli | 3,2 | 2,9 | 3,4 |
| Prostata | 107,4 | 105,8 | 108,9 |
| Testicolo | 7,1 | 6,8 | 7,5 |
| Rene, comprese vie urinarie | 21,4 | 20,5 | 22,3 |
| Solo Parenchima renale | 17,4 | 16,8 | 18,0 |
| Vescica: tumori infiltranti | 53,5 | 52,4 | 54,6 |
| Vescica: tumori non infiltranti | 37,6 | 36,7 | 38,5 |
| Sistema nervoso centrale (maligni) | 10,5 | 10,1 | 11,0 |
| Tiroide | 8,7 | 8,3 | 9,1 |
| Linfoma di Hodgkin | 4,2 | 3,9 | 4,5 |
| Linfoma non-Hodgkin | 22,2 | 21,5 | 22,9 |
| Mieloma | 8,1 | 7,7 | 8,5 |
| Leucemie: tutte | 16,0 | 14,7 | 17,3 |
| Tutti i tumori, escluso cute non melanoma | 695,9 | 692,1 | 699,8 |



* Tasso Standardizzato Diretto x 100.000 (TSD): è una misura utilizzata per confrontare i dati dell'area in esame con altre aree geografiche per valutare possibili differenze di rischio oncologico; per tale motivo si utilizza una popolazione standard di riferimento (in questo caso quella europea 2013) per eliminare differenze legate alle diverse composizioni per età delle popolazioni in esame

** Intervallo di Confidenza 95%: probabilità al 95 % di contenere il valore reale della stima; si assume, quindi, una possibilità di errore al 5%.


¹ Comprende: Labbro, Lingua, Bocca, Orofaringe, Rinofaringe, Ipofaringe, Faringe NAS, Cavità Nasale



REGISTRO TUMORI REGIONE CAMPANIA - INCIDENZA ONCOLOGICA FEMMINE

ANNI 2010 - 2017 - TASSI STANDARDIZZATI EUROPA 2013

| Sede | CAMPANIA | | |
|---|----------|------------|-------|
| | TSD* | I.C. 95%** | |
| | | INF. | SUP. |
| Esofago | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
| Testa Collo ¹ | 5,9 | 5,1 | 6,8 |
| Stomaco | 14,4 | 13,9 | 14,9 |
| Colon, retto e ano | 53,9 | 52,7 | 55,3 |
| Fegato | 14,9 | 14,4 | 15,4 |
| Colecisti e vie biliari | 7,6 | 7,3 | 8,0 |
| Pancreas | 13,0 | 12,6 | 13,5 |
| Laringe | 1,9 | 1,7 | 2,1 |
| Polmone | 30,4 | 29,7 | 31,1 |
| Osso | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
| Melanomi: cute | 14,5 | 14,0 | 15,0 |
| Mesotelioma | 0,8 | 0,7 | 1,0 |
| S. di Kaposi | 1,1 | 1,0 | 1,3 |
| Tessuti molli | 2,3 | 2,1 | 2,5 |
| Mammella | 125,6 | 124,2 | 127,1 |
| Utero Cervice | 7,3 | 7,0 | 7,7 |
| Utero corpo | 22,1 | 21,5 | 22,7 |
| Ovaio | 13,4 | 12,9 | 13,9 |
| Rene, comprese vie urinarie | 9,5 | 9,0 | 10,1 |
| Solo Parenchima renale | 8,3 | 7,9 | 8,7 |
| Vescica: tumori infiltranti | 8,9 | 8,6 | 9,3 |
| Vescica: tumori non infiltranti | 6,9 | 6,5 | 7,2 |
| Sistema nervoso centrale (maligni) | 7,2 | 6,9 | 7,6 |
| Tiroide | 25,4 | 24,8 | 26,1 |
| Linfoma di Hodgkin | 3,8 | 3,5 | 4,0 |
| Linfoma non-Hodgkin | 16,0 | 15,5 | 16,6 |
| Mieloma | 5,8 | 5,5 | 6,2 |
| Leucemie: tutte | 10,2 | 9,3 | 11,2 |
| Tutti i tumori, escluso cute non melanoma | 468,1 | 465,3 | 470,9 |



* Tasso Standardizzato Diretto x 100.000 (TSD): è una misura utilizzata per confrontare i dati dell'area in esame con altre aree geografiche per valutare possibili differenze di rischio oncologico; per tale motivo si utilizza una popolazione standard di riferimento (in questo caso quella europea 2013) per eliminare differenze legate alle diverse composizioni per età delle popolazioni in esame

** Intervallo di Confidenza 95%: probabilità al 95 % di contenere il valore reale della stima; si assume, quindi, una possibilità di errore al 5%.

¹ Comprende: Labbro, Lingua, Bocca, Orofaringe, Rinofaringe, Ipofaringe, Faringe NAS, Cavità Nasale