




REGISTRO TUMORI REGIONE CAMPANIA - MORTALITÀ ONCOLOGICA MASCHI

PERIODI: 2010 - 2013; 2014-2017 - TASSI STANDARDIZZATI EUROPA 2013

SEDE	2010-2013			2014-2017			Δ^2
	TSD*	I.C. 95%**		TSD*	I.C. 95%**		
		INF.	SUP.		INF.	SUP.	
Esofago	3,6	3,3	4,1	3,2	2,8	3,6	-0,5
Testa Collo ¹	6,1	4,8	7,9	5,7	4,5	7,4	-0,4
Stomaco	20,9	19,9	21,9	19,2	18,3	20,1	-1,7
Colon, retto e ano	38,1	36,3	40,0	38,8	37,1	40,7	0,8
Fegato	32,6	31,4	33,9	28,2	27,1	29,4	-4,4
Colecisti e vie biliari	5,9	5,4	6,4	5,0	4,6	5,5	-0,9
Pancreas	14,9	14,1	15,7	15,6	14,8	16,5	0,8
Laringe	8,0	7,4	8,6	6,7	6,2	7,3	-1,3
Polmone	114,5	112,2	116,9	106,5	104,4	108,8	-8,0
Osso	1,7	1,4	2,0	1,6	1,3	1,9	-0,1
Melanomi: cute	3,8	3,4	4,2	3,4	3,1	3,8	-0,4
Mesotelioma	1,6	1,3	1,9	2,6	2,3	3,0	1,0
S. di Kaposi	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,6	0,2
Tessuti molli	1,3	1,1	1,6	1,0	0,8	1,2	-0,4
Prostata	36,7	35,3	38,2	33,6	32,3	35,0	-3,1
Testicolo	0,4	0,3	0,6	0,5	0,3	0,6	0,0
Rene, comprese vie urinarie	8,4	7,6	9,3	9,3	8,5	10,2	0,9
Solo Parenchima renale	6,0	5,5	6,6	8,1	7,6	8,8	2,1
Vescica	30,3	28,9	31,8	27,4	26,2	28,8	-2,9
Sistema nervoso centrale	11,3	10,4	12,3	11,3	10,4	12,2	0,0
Tiroide	1,1	0,9	1,4	0,8	0,6	1,0	-0,3
Linfoma di Hodgkin	1,2	1,0	1,4	1,0	0,8	1,3	-0,1
Linfoma non-Hodgkin	9,3	8,7	10,0	8,1	7,5	8,7	-1,3
Mieloma	5,3	4,9	5,9	5,3	4,8	5,8	0,0
Leucemie: tutte	12,4	10,8	14,2	11,5	10,0	13,2	-0,9
Tutti i tumori, escluso cute non melanoma	395,4	391,1	399,8	370,3	366,2	374,5	-25,1



* Tasso Standardizzato Diretto x 100.000 (TSD): è una misura utilizzata per confrontare i dati dell'area in esame con altre aree geografiche per valutare possibili differenze di rischio oncologico; per tale motivo si utilizza una popolazione standard di riferimento (in questo caso quella europea 2013) per eliminare differenze legate alle diverse composizioni per età delle popolazioni in esame

** Intervallo di Confidenza 95%: probabilità al 95 % di contenere il valore reale della stima; si assume, quindi, una possibilità di errore al 5%.

¹ Comprende: Labbro, Lingua, Bocca, Orofaringe, Rinofaringe, Ipofaringe, Faringe NAS, Cavità Nasale


² Differenza tra i tassi standardizzati dei 2 periodi temporali	diff. significativa in difetto
	diff. non significativa
	diff. significativa in eccesso



REGISTRO TUMORI REGIONE CAMPANIA - MORTALITÀ ONCOLOGICA FEMMINE

PERIODI: 2010 - 2013; 2014-2017 - TASSI STANDARDIZZATI EUROPA 2013

Sede	2010-2013			2014-2017			Δ ²
	TSD*	I.C. 95%**		TSD*	I.C. 95%**		
		INF.	SUP.		INF.	SUP.	
Esofago	0,8	0,7	1,0	0,9	0,7	1,1	0,1
Testa Collo ¹	2,1	1,5	3,0	2,2	1,6	3,1	0,1
Stomaco	11,4	10,8	12,0	9,9	9,4	10,5	-1,4
Colon, retto e ano	22,0	20,9	23,2	22,2	21,1	23,4	0,2
Fegato	14,3	13,6	15,0	11,6	11,0	12,2	-2,7
Colecisti e vie biliari	6,1	5,7	6,6	5,4	5,0	5,8	-0,7
Pancreas	11,8	11,2	12,5	12,0	11,4	12,7	0,2
Laringe	0,7	0,6	0,9	0,8	0,6	1,0	0,1
Polmone	23,6	22,7	24,5	26,1	25,2	27,0	2,5
Osso	0,8	0,7	1,0	1,0	0,8	1,2	0,2
Melanomi: cute	2,5	2,2	2,8	2,2	2,0	2,5	-0,3
Mesotelioma	0,4	0,3	0,5	0,7	0,5	0,9	0,3
S. di Kaposi	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2
Tessuti molli	0,8	0,7	1,0	0,9	0,7	1,1	0,0
Mammella	32,2	31,2	33,3	32,7	31,7	33,8	0,5
Utero: tutto	9,2	8,4	10,1	8,7	7,9	9,6	-0,5
Ovaio	7,4	6,9	7,9	8,2	7,7	8,7	0,8
Rene, comprese vie urinarie	3,2	2,8	3,7	3,4	3,0	3,8	0,2
Solo Parenchima renale	2,5	2,2	2,8	3,1	2,8	3,5	0,6
Vescica	4,2	3,8	4,7	4,6	4,2	5,1	0,4
Sistema nervoso centrale	8,1	7,4	8,8	7,9	7,2	8,6	-0,2
Tiroide	1,1	0,9	1,3	0,8	0,7	1,0	-0,3
Linfoma di Hodgkin	0,8	0,6	0,9	0,6	0,5	0,8	-0,1
Linfoma non-Hodgkin	5,8	5,4	6,3	4,8	4,4	5,2	-1,0
Mieloma	3,5	3,2	3,9	3,8	3,4	4,1	0,3
Leucemie: tutte	7,5	6,5	8,6	6,8	5,8	7,8	-0,7
Tutti i tumori, escluso cute non melanoma	198,1	195,6	200,7	195,6	193,1	198,2	-2,5



* Tasso Standardizzato Diretto x 100.000 (TSD): è una misura utilizzata per confrontare i dati dell'area in esame con altre aree geografiche per valutare possibili differenze di rischio oncologico; per tale motivo si utilizza una popolazione standard di riferimento (in questo caso quella europea 2013) per eliminare differenze legate alle diverse composizioni per età delle popolazioni in esame

** Intervallo di Confidenza 95%: probabilità al 95 % di contenere il valore reale della stima; si assume, quindi, una possibilità di errore al 5%.

¹ Comprende: Labbro, Lingua, Bocca, Orofaringe, Rinofaringe, Ipofaringe, Faringe NAS, Cavità Nasale

² Differenza tra i tassi standardizzati dei 2 periodi temporali	diff. significativa in difetto
	diff. non significativa
	diff. significativa in eccesso